



## Les urgences chez le chien et le chat - 1<sup>ère</sup> partie

Mon chien saigne, mon chat boite... pas toujours facile de déterminer s'il faut consulter rapidement ou si au contraire, ça peut attendre ! Voici trois exemples de situations réellement urgentes auxquelles vous pourriez être confrontés.

### L'accident de la voie publique et la défenestration

Les blessures peuvent aller de la simple entorse jusqu'à l'hémorragie interne ou la paralysie des membres. Malheureusement, les blessures les plus graves ne sont pas forcément les plus visibles. En effet, un chien peut se relever d'un choc avec une voiture, mais avoir les **organes abdominaux atteints** (rupture de la vessie p.ex.). Lors d'un choc, **évités au maximum de manipuler ou de déplacer votre animal**. Portez-le sur un drap qui fera office de civière. Essayez d'arrêter tout saignement visible en appuyant sur la plaie avec une compresse ou un linge propre. Consultez immédiatement dans tous les cas.



Les **défenestrations** sont fréquentes chez les chats en ville. Les blessures les plus rencontrées sont les fractures, mais aussi les hémorragies internes, les ruptures diaphragmatiques et les pneumothorax (de l'air autour du poumon, qui empêche le chat de respirer). Là aussi, il vaut mieux consulter, même si votre chat ne semble pas être blessé.

### Le syndrome urologique félin

Le chat mâle peut, de part l'anatomie de ses voies urinaires, être victime d'une **obstruction de l'urètre** par un bouchon de **calculs, de cristaux, de mucus ou un caillot**. Il se retrouve alors dans l'impossibilité d'uriner, avec des conséquences souvent graves pour les

reins. De manière très caractéristique, il se met souvent en position pour uriner, sans y parvenir. Il est fréquent de voir des petites **gouttes d'urine teintées de sang** dans la litière ou même à travers l'habitation. Il est important de ne pas confondre ces symptômes avec ceux d'une constipation, car une **intervention précoce par le vétérinaire est impérative** (le jour même, n'attendez pas). Une sonde urinaire doit être placée sous anesthésie générale, afin de repousser le bouchon et de vidanger la vessie. Une alimentation de mauvaise qualité constitue une des causes principales, ainsi que la tendance du chat à boire peu de façon naturelle.

### Les convulsions

Lors d'une crise convulsive, tous les muscles se contractent en même temps, l'animal perd connaissance et peut aussi vocaliser, saliver, uriner, déféquer. Généralement, les convulsions ne durent que **quelques secondes à quelques minutes**. L'animal se réveille ensuite, mais peut rester déboussolé quelques minutes à quelques heures avec des difficultés à reconnaître son entourage, se déplacer etc.



## Nouveau à la clinique

Votre chien ou chat se gratte incessamment ? Ses symptômes s'améliorent lorsque vous lui administrez des corticoïdes mais reviennent dès que vous arrêtez les traitements ? Nous sommes heureux de pouvoir désormais vous proposer un **test intra-dermique pour le diagnostic des allergies** chez le chien ou le chat. Ce test se fait à la clinique et nécessite une légère tranquillisation. Il consiste à raser un petit carré sur le côté du thorax et d'injecter de toutes petites quantités d'allergènes dans la peau.



Si l'animal est allergique, une petite papule se forme au niveau du site d'injection de l'allergène en question. Vous avez ensuite la possibilité de mettre en place un traitement de désensibilisation afin de réduire plus durablement les symptômes de votre compagnon. N'hésitez pas à nous en parler !

## Alerte Myxomatose

Plusieurs cas de myxomatose se sont présentés à la clinique depuis la rentrée. Nous vous rappelons que c'est une maladie fréquemment mortelle et qu'il existe un vaccin qui protège efficacement les lapins. Il est encore temps de le faire vacciner !



## L'arrivée d'un nouveau compagnon à la maison : PENSE-BÊTE

Vous y avez réfléchi à deux fois, toute la famille est d'accord : vous voilà prêt à accueillir un chien ou un chat chez vous. Si c'est votre premier animal, ce petit pense-bête devrait vous aider à vous organiser pour ses soins de santé :



<b>Vaccins contre la leptospirose, la maladie de carré, l'hépatite et la parvovirose</b>	Généralement 1er vaccin vers l'âge de 8 semaines (souvent réalisé chez l'éleveur) et rappel à 12 semaines d'âge
<b>Vaccin contre la rage</b>	Si vous souhaitez pouvoir quitter le territoire avec votre animal de compagnie; âge minimum: 12 semaines; une seule injection suffit
<b>Vermifugation</b>	Minimum tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois, ensuite tous les 3 mois
<b>Le traitement antipuce</b>	Des produits antipuce efficaces existent, même pour les animaux très jeunes, n'hésitez pas à nous demander conseil!
<b>L'examen vétérinaire</b>	Se fait en général lors de la vaccination; votre animal sera examiné sous toutes ses coutures afin de déceler d'éventuels problèmes congénitaux ou maladies
<b>Autres vaccins</b>	Il existe des vaccins contre d'autres maladies : la leishmaniose, la piroplasmose, la borreliose. Ces vaccins sont généralement administrés après l'âge de 6 mois, car ils ne peuvent pas être administrés avec les autres vaccins
<b>L'alimentation</b>	Choisissez des croquettes de bonne qualité et laissez-nous vous guider dans votre choix.

### La mutuelle animale

Votre animal, même jeune, n'est pas à l'abri d'une maladie ou d'un accident qui peut engendrer des frais imprévus et souvent coûteux. Une mutuelle qui rembourse vos soins vétérinaires vous permet de faire face à ces dépenses immédiatement.

## Pourquoi faire stériliser son lapin ?

La fertilité du lapin est légendaire. Lorsque l'on possède un couple de lapins, la question de la stérilisation se pose donc tout naturellement. En revanche, lorsque le lapin est célibataire, rares sont les propriétaires de lapins qui songent à la stérilisation. Pourtant, celle-ci est bénéfique.

### Éviter la surpopulation

De nombreux lapins sont abandonnés chaque semaine et certains attendent plus d'un an dans un refuge avant d'être adoptés. Si vous avez un couple de lapins, nous vous conseillons donc de les faire stériliser tous les deux afin de leur permettre une vie harmonieuse sans harcèlement, ni lutte, ni reproduction. Le lapin est un animal social, auquel la présence d'un congénère de sexe opposé apporte sérénité, distraction et équilibre.

### Santé de la femelle

Le risque de tumeur utérine ou ovarienne peut atteindre 80% chez la lapine de plus de 5 ans non stérilisée. La stérilisation permet d'assurer une longévité égale à celle des mâles (8-10 ans) et se pratique idéalement entre 6 mois et 1 an.

### Santé du mâle

La castration permet au mâle de vivre sa vie plus sereinement et de cohabiter avec une compagne.

Une mâle non opéré marque beaucoup son territoire (jets d'urine et crottes), ce qui rend sa vie en liberté ou semi-liberté quasi impossible.

### Amélioration du bien-être

Le lapin subit à l'état sauvage une forte pression hormonale qui le pousse à s'accoupler et à défendre son territoire. L'agressivité, généralement liée à la défense du territoire, est souvent source d'incompréhension de la part du propriétaire. Ce comportement n'est plus nécessaire à sa survie lorsque le lapin vit en captivité et disparaît avec la stérilisation.

